



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAN PHÁT ĐẠT ::::

PRODUCT CATALOGUE

2026



NHÓM THỨC ĂN CHỨC NĂNG, VITAMIN TỔNG HỢP CHỐNG SỐC TRƯỚC THẢ GIỐNG, THAY ĐỔI THỜI TIẾT



ACTIVE YEAST (ĐẠM SÁ SÙNG)

THÀNH PHẦN

- Đạm thủy phân: 60%
- Protein: 18%
- Bổ sung vitamin A, B1, B2, B12, K,...
- Cùng các thành phần khác vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Thức ăn chức năng: kích thích tôm bắt mồi nhanh, ruột to - rõ, tăng trọng về size, lớn nhanh
- Tạo sắc tố đỏ cho tôm

CÁCH DÙNG

- Ăn từ thức ăn số 01.
- Trộn 10-20mg/kg TĂ/3 cử/ngày, ăn suốt quá trình nuôi.
- Ruột tôm yếu ngưng cho ăn, khắc phục đường ruột ổn định thì cho ăn lại.

SIÊU DINH DƯỠNG TẢO BIỂN

THÀNH PHẦN

- Các loại vitamin như: C, B2, K, A, E, B1, B3,...
- Cùng các hợp chất khác vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Cung cấp amino acid, vitamin, protein và dưỡng chất từ tảo tự nhiên, bổ sung thành phần mà thức ăn công nghiệp còn thiếu.
- Tăng sức đề kháng, thúc đẩy sinh trưởng, hỗ trợ vật nuôi phát triển khỏe mạnh.

CÁCH DÙNG

- Trộn 5-10ml/kg TĂ. Cho ăn suốt quá trình nuôi.
- Tạt bổ sung 1 lít/1.000m³, định kỳ 1 tuần/lần.
- Tạt 2 lít/1.000m³ nếu nắng nóng hoặc mưa nhiều.



B COMPLEX B12

THÀNH PHẦN

- Vitamin B2
- Vitamin B12
- Vitamin B6
- Cùng các thành phần vitamin khác

CÔNG DỤNG

- Giảm stress, chống sốc khi thay đổi thời tiết và khi thả giống.
- Tăng tỉ lệ sống cho tôm.
- Hạn chế tôm giảm ăn, chậm phát triển,...

CÁCH DÙNG

- Cho ăn 5g/kg TĂ/3 cử/ngày. Cho ăn suốt vụ nuôi.
- Khi thả giống/sang tôm/sốc nhiệt do mưa nắng thất thường, tôm yếu ăn: 500g/1.000-1.500m³.

NHÓM THẢO DƯỢC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ GAN (NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC)



CÀ GAI LEO - GOLD

THÀNH PHẦN

- Sorbitol
- Methionine
- Bổ sung thảo dược Cà gai leo cô đặc vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Khắc phục tình trạng vàng gan, sưng gan, mất tế bào gan, ăn yếu hoặc bỏ ăn, tôm lờ đờ do bệnh gan.
- Bảo vệ tế bào gan, phục hồi chức năng gan tụy.
- Kháng viêm, kháng khuẩn, bảo vệ gan.

CÁCH DÙNG

- Trộn ngày 3 cử: 10-20ml/kg thức ăn.
- Khi tôm bị teo gan, trộn 20-40ml/kg TĂ
- Khi thấy gan vàng hoặc thiếu lipid, tạt liều 2 lít/1.000m³ nước.

GAN TẠT CÀ GAI LEO

THÀNH PHẦN

- Sorbitol
- Chất dẫn thảo dược Cao Cà gai leo, Cao Atiso, Cao Diệp hạ châu,...cùng nhiều thành phần khác vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Đào thải, giải độc và chuyển hóa độc trong gan tôm.
- Khắc phục tình trạng gan tôm yếu, vàng gan, mỡ đục trắng gan và kích thích tôm thêm ăn.

CÁCH DÙNG

- Trước khi thả giống: Tạt 2 lít/1.000m³ nước.
- Tạt định kỳ: 1 lít/1.000-1.500m³ nước, 3 ngày/lần và kết hợp cho ăn 20ml/kg TĂ, xuyên suốt vụ nuôi.



NANO CURCUMIN

THÀNH PHẦN

- Enzyme Cenllulase
- Bổ sung Cao Nghệ đen, Cao gừng đen, Cao Tỏi đen và được liệu quý hỗ trợ gan.

CÔNG DỤNG

- Đào thải độc tố trong gan Tôm, Cá.
- Điều trị phù nề, gan thận mủ.
- Tăng khả năng miễn dịch, chống lại các vi bào tử trùng.
- Kháng khuẩn, liền thương, loại bỏ mủ, máu độc trên cá.

CÁCH DÙNG

- Phòng bệnh: 5-10ml/kg TĂ, ngày 3 cử, suốt vụ nuôi.
- Điều trị: 20-40ml/kg TĂ, ngày 3 cử, suốt quá trình điều trị.
- Kết hợp tạt 1 lít/2.000-4.000m³ nước.

NHÓM THẢO DƯỢC PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ ĐƯỜNG RUỘT (NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN, HÀN QUỐC)



PROBIO GOLD

THÀNH PHẦN

- Bacillus subtilis
- Bacillus clausii
- Bacillus polymyxa
- Clostridium butyricum

CÔNG DỤNG

- Tăng miễn dịch, nâng cao tỉ lệ sống và tăng trưởng.
- Ức chế mầm bệnh TPD, EHP.
- Cải thiện tiêu hóa, tăng hấp thu thức ăn và giảm FCR.

CÁCH DÙNG

- Trộn cho ăn: 3-5ml/kg thức ăn.
- Tạt bổ sung vào môi trường: 500g/1.000-1.500m³ nước (Có thể điều chỉnh dựa vào tình trạng ao và sức khỏe vật nuôi).

DỊCH CAO TỎI ĐEN

THÀNH PHẦN

- Cellulase
- Lipase
- Bổ sung dịch Cao Tỏi đen, Cao Atiso, Cao Mật nhân vừa đủ.

CÔNG DỤNG

- Giải độc gan, ngừa bệnh phân lỏng, phân trắng cho tôm, cá.
- Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn, giúp đường ruột nở to, tôm - cá lớn nhanh.
- Ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột cho tôm và cá.

CÁCH DÙNG

- 5-10ml/kg thức ăn, ăn 3 cử sáng - trưa - chiều.
- Ăn suốt quá trình nuôi
- Lưu ý: Lắc đều trước khi dùng, có thể trộn chung với kháng sinh.



EHP ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG

THÀNH PHẦN

- Protease
- Bổ sung thảo dược Hoàng Đăng, Xuyên Tâm Liên, tinh dầu trầm vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Loại bỏ vibrio và vi bào tử trùng khỏi ruột tôm.
- Ngăn chặn tôm chậm lớn, còi cọc do nhiễm khuẩn.
- Điều trị phân lỏng, phân trắng, phân 2 màu.
- Điều trị bệnh mũ đuôi (đốt thứ 6), tôm khỏe, phát triển tốt.

CÁCH DÙNG

- Phòng bệnh: 2g/kg TĂ, ngày 3 cử, ăn liên tục 3 ngày, 5 ngày cho ăn lại.
- Trị bệnh: 5g/kg TĂ, ngày 3 cử, ăn liên tục 5 ngày.



BIO GOLD

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Bổ sung siêu chủng vi sinh và nấm men vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Bổ sung 20 triệu lợi khuẩn vào khẩu phần ăn giúp đường ruột tôm nong to và cân bằng pH.
- Giảm hiện tượng phân đứt khúc, phân 2 màu và phân trắng - rỗng ruột.

CÁCH DÙNG

- Trộn 5g/kg thức ăn, 3 cử/ngày, ăn suốt quá trình nuôi.
- Hỗ trợ điều trị phân lỏng, phân 2 màu, phân trắng hoặc kỷ sinh trùng, kết hợp bộ đôi thảo dược (OSAKA 20g + BiO GOLD 20g)/ kg thức ăn, 3 cử/ngày.

BIO PLUS

THÀNH PHẦN

- Amylase
- Cellulase
- Bổ sung siêu chủng vi sinh và nấm men tảo

CÔNG DỤNG

- Bổ sung vi khuẩn có lợi và men tảo, giúp đường ruột tôm nong to - rõ - chắc - khỏe.
- Tăng cường khả năng hấp thụ chất, khả năng miễn dịch, cân bằng pH đường ruột cho tôm.
- Kích thích tái tạo cá Enzyme hữu ích, giúp tôm hấp thụ thức ăn tốt nhất.

CÁCH DÙNG

- Trộn 5g/kg thức ăn, 2 cử/ngày (sáng - chiều).
- Ăn suốt quá trình nuôi



ACID ORGANIC

THÀNH PHẦN

- Formic acid
- Lactic acid
- Flourine
- Dung môi vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Tăng cường tiêu hóa cho tôm cá.
- Đào thải vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa, cải thiện sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống.
- Số kỷ sinh trùng trong ruột tôm, cá
- Ngăn chặn triệu chứng rỗng ruột, phân trắng, ruột lò xo, hạt gạo đốt 6 do vi bào tử trùng.

CÁCH DÙNG

- Cho ăn suốt vụ nuôi: sử dụng 5-10ml/kg TĂ, 2 lần/ngày.
- Khi phát hiện các bệnh đường ruột kết hợp cho ăn và tạt 2 lít/1.000m³ nước vào buổi sáng sớm.



OSAKA

THÀNH PHẦN

- Xylanase
- Cellulase
- Cùng các hợp chất và thảo dược vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Đặc trị phân trắng, ký sinh trùng đường ruột giai đoạn đầu và suốt quá trình nuôi.

CÁCH DÙNG

- Phòng bệnh: trộn 5-10g/kg TĂ, cho ăn sáng - chiều. Định kỳ 7 ngày, sau đó ngưng 3 ngày cho ăn lại.
- Trị bệnh: Xử lý môi trường bằng Iodine: 1 lít/1.000m³ nước.
 - Ngày 1: Cắt cử ăn nguyên ngày đầu.
 - Ngày 2: Giảm 50% lượng thức ăn để trộn bộ đôi 20g OSAKA và 20g BIO GOLD/kg TĂ/3 cử/ngày.

MRS PEATONGTARN THÁI LAN

THÀNH PHẦN

- Zn
- Xylanase
- Cellulase

CÔNG DỤNG

- Đặc trị phân trắng, ký sinh trùng đường ruột giai đoạn đầu.
- Hỗ trợ phòng và điều trị phân đứt khúc, phân trắng, mũ đuôi.

CÁCH DÙNG

- Phòng bệnh: Trộn 5-10g/kg TĂ, sáng và chiều/ngày. Định kỳ 7 ngày ngưng 3 ngày cho ăn lại.
- Trị bệnh:
 - Ngày 1: Cắt cử ăn nguyên ngày đầu.
 - Ngày 2: Giảm 50% lượng thức ăn, trộn 20g/kg TĂ/3 cử/ngày. Ăn liên tục 3 ngày, tối đa 5 ngày.



LACTO - GOLD

THÀNH PHẦN

- Bacillus subtilis spp
- Saccharomyces cerevisiae
- Chất mang Cellulase vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Kích thích tôm, cá và ốc thèm ăn, nong to, rõ và thẳng đường ruột, giảm pH đường ruột.
- Kích thích tôm, cá, ếch thèm ăn, phân chắc, ruột đầy.
- Ưc chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

CÁCH DÙNG

- 5-5ml/kg thức ăn.
- Ngày ăn 3-4 cử.
- Ăn suốt quá trình nuôi.

NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC



NANO BẠC ĐỒNG

THÀNH PHẦN

- Bacillus subtilis spp
- Saccharomyces cerevisiae
- Chất mang Cellulase vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Kích thích tôm, cá và ốc thèm ăn, nong to, rõ và thẳng đường ruột, giảm pH đường ruột.
- Kích thích tôm, cá, ếch thèm ăn, phân chắc, ruột đầy.
- Ưc chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

CÁCH DÙNG

- 5-5ml/kg thức ăn.
- Ngày ăn 3-4 cử.
- Ăn suốt quá trình nuôi.

ROCKET B52 WIN 9999

THÀNH PHẦN

- Glutaraldehyde
- Bổ sung dung môi, hoạt chất diệt nấm, diệt khuẩn vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, vibrio,...
- Phòng và trị các bệnh đốm đen trên tôm nuôi: phân trắng, phát sáng, mòn đuôi, cụt râu,...
- An toàn tuyệt đối, không gây sốc cho tôm.

CÁCH DÙNG

- Xử lý trước khi thả tôm 2 ngày: 1-2 lít/1.000-2.000m³ nước.
- Trong quá trình nuôi: 0,5 lít/1.000m³ nước, định kỳ 3-5 ngày/lần, khi xử lý nên chạy quạt tối đa.
- Diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng: 1 lít/1.000-1.500m³. Sử dụng lúc 8-9 giờ sáng, chạy quạt liên tục.



YUCCA - LIQUID

THÀNH PHẦN

- Saponin
- Dung môi vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Loại bỏ và ngăn chặn sự phát sinh khí độc như H₂S, NH₃,...
- Khắc phục nhanh tôm nổi đầu, kéo đàn do khí độc, thiếu oxy.
- Gia tăng tỉ lệ sống, giảm tỉ lệ hao hụt tôm.
- Kích thích tôm lột xác.

CÁCH DÙNG

- 1 lít/2.000-3.000m³, định kỳ 5-7 ngày/lần.
- Cấp cứu tôm, cá nổi đầu: 1 lít/1.000-2.000m³.
- Chú ý: Thời gian cách ly 0 ngày. Lắc đều trước khi sử dụng. Có thể tăng giảm liều tùy vào môi trường nước trong ao.



NHÓM NGUYÊN LIỆU XỬ LÝ NƯỚC, DIỆT VI KHUẨN PHÁT SÁNG VÀ GIẢI PHÓNG KHÍ ĐỘC



NANO COPPER (ĐỒNG)

THÀNH PHẦN

- Nano Đồng
- Bổ sung chất điện ly vừa đủ vào CuSO_4

CÔNG DỤNG

- Tiêu diệt nhanh các mầm bệnh gây hại cho tôm, cá như vi khuẩn, nấm, tảo độc, ký sinh trùng đơn bào...ao nuôi.
- Hạn chế nhớt đáy, nấm, rong bờ, tảo độc (rảo đỏ, tảo lam,...).

CÁCH DÙNG

- Diệt khuẩn trước khi thả giống: 1 lít/1.300m³ nước.
- Diệt nấm đồng tiền: 1 lít/700-800m³ nước.
- Diệt tảo độc: 1 lít/1.500m³ nước.

(Khuyến cáo diệt tảo kết hợp 1 lít Nano Đồng với 10kg vôi, sử dụng lúc 16 giờ sau cấp nước, vôi tạt trước 10 phút).

MEN VI SINH VPD BIO

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Bổ sung Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens làm chất mang

CÔNG DỤNG

- Khắc chế nấm đồng tiền, vi khuẩn, ký sinh trùng trên mang tôm, cá.
- Giảm tích tụ bùn hữu cơ, chất nền đáy ao.
- Cải thiện nước, kiểm soát khí NH_3 , H_2S .

CÁCH DÙNG

- Hòa tan 500g + 50 lít nước + 1kg mật đường, sục khí vi sinh trong 4-6 giờ, tạt đều hết xuống ao lúc 23 giờ khuya.
- Sử dụng 3 ngày liên tiếp nếu nước tảo ao chưa như ý, nặng có thể kết hợp xử lý cùng POND CLEAR.



AKALOID NANO

THÀNH PHẦN

- Xylanase
- Cellulase
- Bổ sung thảo dược chiết xuất tinh dầu dạng nano cau tươi, nghệ tươi dạng đậm đặc vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Ngăn chặn nhiễm khuẩn chéo và tăng cường tiêu hóa cho tôm, cá, ốc, ếch, lươn.
- Đảo thải virus, vi khuẩn, ký sinh trùng có hại trong hệ tiêu hóa, cải thiện sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống vật nuôi.
- Giảm pH trong đường ruột, tạo môi trường bất lợi cho mầm bệnh

CÁCH DÙNG

- Cho ăn suốt vụ nuôi: 5ml/kg thức ăn, ngày 2 cử sáng - chiều.
- Khi phát hiện tôm, cá, ốc, ếch, lươn bị phân sống, phân nát, phân đứt khúc và phân trắng: 10ml/kg thức ăn, 3 cử/ngày.
- Kết hợp tạt 1 lít /1.000-1.500m³ nước vào buổi sáng sớm.

NHÓM KHOÁNG CHẤT TẠT VÀ TRỘN CHO ĂN



KHOÁNG TẠT CAO CẤP SUNRISE

THÀNH PHẦN

- CaO
- CaCO₃
- MgO
- Cùng các hợp chất khác như: Fe₂O₃, chất đệm vitamin C,...

CÔNG DỤNG

- Bổ sung khoáng vi lượng vào môi trường nước.
- Giảm hiện tượng cong thân đục cơ...
- Tạo màu nước, ổn định tảo có lợi cho ao tôm.

CÁCH DÙNG

- Lắng tụ chất lơ lửng hữu cơ: 10kg/10.000m³ nước.
- Tôm lột vỏ, cứng vỏ - chắc thịt: 2kg/1.000m³ nước.

SUPER CALCIUM

THÀNH PHẦN

- Hỗn hợp các nguyên tố vi lượng: K₂O, Ca, Mg, Cl,...
- Bổ sung Zn sulphate, Copper sulfate, Dicalcium phosphate vừa đủ.

CÔNG DỤNG

- Bổ sung siêu khoáng Nano canxi hữu cơ dạng ion dễ hấp thu đường ruột.
- Làm nhanh cứng vỏ tôm, chắc thịt, nặng ký.
- Giai đoạn đầu thả tôm cần tạt cho tôm nhanh cứng vỏ, lột dính vỏ.

CÁCH DÙNG

- 1 lít/500-700m³ khi ương tôm giống.
- Trộn 5ml cho 1kg thức ăn, dùng định kỳ 2 lần/ngày (sáng - chiều).



ĐẠT NHÂN ĐƯỜNG

THÀNH PHẦN

- Cellulase
- Bổ sung tinh dầu thảo dược Hoa Kim Ngân, Atiso, Cao Xạ Đen vừa đủ 1 lít.

CÔNG DỤNG

- Phòng và điều trị hiệu quả nội ký sinh trên tôm.
- Phòng và điều trị hiệu quả ngoại ký sinh trên mang và da cá như trùng mỏ neo, rận cá, sáng lá gan,...
- Làm trong túi mật, trị tuột túi mật.

CÁCH DÙNG

- Phòng bệnh: 10ml/kg thức ăn, ăn ngày 3 cử, ăn liên tục suốt vụ nuôi.
- Điều trị: 20ml/kg thức ăn, ngày 3 cử, liên tục 5 ngày điều trị.



NHÓM VI SINH XỬ LÝ ĐÁY AO VÀ GÂY MÀU NƯỚC



POND MAX

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Chất bổ sung Yucca, Saccharomyces cerevisiae vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Kiểm hãm vi khuẩn gây bệnh TPD và EHP trên tôm, cá.
- Phân hủy chất thải hữu cơ đáy ao, ngăn chặn sự tạo mùn, độ nhớt đáy ao.
- Loại bỏ khí độc trong ao như: H₂S, NH₃, NO₂,...

CÁCH DÙNG

- Dùng cho tôm: 250g/50 lít nước tạt đều khắp mặt ao cho 2.000-4.000m³ nước, định kỳ 3-5 ngày/lần.
- Dùng cho cá: 250g/50 lít nước tạt đều khắp mặt ao cho 4.000-6.000m³ nước, định kỳ 3-5 ngày/lần.

DRT

THÀNH PHẦN

- Cu (max-min)
- Chất mang vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Diệt rong trong ao nuôi: rong nhớt, rong đuôi chồn, rong đá.
- Diệt tảo độc: tảo lam, tảo giáp, tảo phát sáng lab-lab,...
- Phòng và trị các bệnh mang và thân tôm: đóng rong, nhiễm ký sinh trùng.

CÁCH DÙNG

- Cắt tảo: 500g/1.000m³ nước.
- Giảm và ổn định tảo: 500g/2.000m³ nước, định kỳ 5-7 ngày/lần.



E.M YẾM KHÍ (GỐC)

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Chất mang Saccharomyces cerevisiae, cám gạo vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Xử lý sạch tạp chất (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
- Phân hủy nhanh khí độc NH₃, H₂S, NO₂ trong ao.
- Ưc chế tảo độc, ổn định pH nước ao nuôi.

CÁCH DÙNG

- Dùng 100gr EM GỐC + 500gr đường mật rỉ + 200g muối hạt + 18 lít nước + 1 trái khóm,, khuấy đều và đậy nắp kín (ủ yếm khí). 3 ngày sau thành EM1.
- Gây màu tảo: 5 lít/1.000m³ nước vào lúc 8 giờ sáng.
- Giữ tảo: 5 lít/1.000m³ nước vào lúc 17 giờ.
- Chuyển tảo: Kết hợp 500g POND CLEAR và 15 lít EM/1.000m³ vào lúc 23 giờ.



RHODOPSEUDOMONAS

THÀNH PHẦN

- Rhodopseudomonas

CÔNG DỤNG

- Phân hủy nhanh NH_3 , H_2S , NO_2 trong ao.
- Xử lý sạch tạp chất (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
- Cạnh tranh, ức chế tảo độc và vi khuẩn Vibrio spp, ổn định màu nước.

CÁCH DÙNG

- Cách ủ: 20g Rhodopseudomonas + 200g đường cát vàng + 1 lít nước sạch (không phải nước máy), phơi dưới nắng 24 giờ trước khi tạt vào nước.
- Sử dụng 10 lít/5.000m³/tuần/2 lần.
- Nếu nước chất lượng kém tăng liều gấp đôi.
- **Lưu ý:** Nếu nước chất lượng kém, tăng liều gấp đôi.

POND CLEAR

THÀNH PHẦN

- Protease
- Lipase
- Amylase

CÔNG DỤNG

- Phân hủy nhanh chất mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm, cá, làm sạch đáy ao, giảm nhớt bạc.
- Khử khí độc giảm mùi hôi do thức ăn phân hủy.
- Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất lượng nước.
- Giảm tảo khi tảo phát triển quá mức.

Đặc biệt: kết hợp vi sinh hiệu quả với tảo lam, tảo đỏ.

CÁCH DÙNG

- Dùng 500g/1.000-2.000 m³ nước, giảm mùi hôi, nhớt bạc.
- Giảm tảo: kết hợp 250g vi sinh POND MAX và 500g POND CLEAR cho 1.000m³ dùng vào lúc 23 giờ.



POND PLUS

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Độ ẩm
- Chất mang cám gạo vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Sạch ngay nhớt bạc.
- Sạch ngay tích tụ bùn bã hữu cơ.
- Tạo màu nước nâu.

CÁCH DÙNG

- 250g + 100 lít nước + 2kg mật đường ủ yếm khí trong 2-3 ngày khi men dậy mùi thơm.
- Sử dụng 3 ngày liên tiếp nếu ao tôm bị nhớt và kết hợp xử lý với POND CLEAR.





SIÊU DIỆT PHÈN

THÀNH PHẦN

- Tổng hợp các chất đa vi lượng: CaCl_2 , MgCl_2 , KCl , NaCl_2 ,...
- Fe
- Bổ sung hợp chất keo tụ vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Chuyên trị phèn nhôm, phèn sắt, chất lơ lửng hữu cơ.
- Khắc phục tôm lột vỏ dính chân và hiện tượng vàng răng vàng chân.
- Kích thích tôm lột vỏ.

CÁCH DÙNG

- Diệt phèn các loại, diệt tảo độc (đỏ, lam,...) và chất lơ lửng hữu cơ: 500g/1.000m³.
- Định kỳ: 500g/1.000-2.000m³, 5-7 ngày/lần.

Chú ý: sử dụng 12 giờ trưa, lúc nắng nóng, chạy quạt liên tục khi xử lý.

CHUYÊN DIỆT PHÈN LẠNH

THÀNH PHẦN

- Tổng hợp các chất đa vi lượng: CaCl_2 , MgCl_2 , KCl , NaCl_2 ,...
- Al
- Bổ sung hợp chất keo tụ vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Đặc biệt chuyên diệt phèn Nhôm.
- Lắng tụ chất lơ lửng hữu cơ.
- Kết tủa phèn nhôm, dễ gây màu nước.
- Không biến động môi trường.
- Kích thích tôm lột vỏ đúng chu kỳ.

CÁCH DÙNG

- Diệt phèn nhôm và chất lơ lửng hữu cơ: 1 lít/700-1.500m³ (tùy vào số lượng mà tăng giảm cho phù hợp).
- Định kỳ: 1 lít/1.000-2.000m³, 5 ngày xử lý 1 lần.

Chú ý: Sử dụng 12 giờ trưa, lúc nắng nóng, chạy quạt liên tục khi xử lý.



GÂY MÀU TẢO SILIC

THÀNH PHẦN

- Tổng hợp các chất đa vi lượng: CaCl_2 , MgCl_2 , KCl , NaCl_2 ,...
- Al
- Bổ sung hợp chất keo tụ vừa đủ

CÔNG DỤNG

- Chuyển gây màu tảo silic.
- Khắc phục tôm lột vỏ dính chân và hiện tượng vàng răng, vàng chân.
- Kích thích tôm lột vỏ.
- Khắc phục chất lơ lửng hữu cơ, phèn sắt.

CÁCH DÙNG

- Gây màu tảo silic: 1 lít/1.000-1.500m³ nước.
- Tôm lột vỏ dính chân: 1 lít/1.500-2.000m³ nước.
- Vàng răng, vàng chân: 1 lít/1.000m³ nước.
- Xử lý chất lơ lửng, phèn vàng: 1 lít/2.000m³ kết hợp khoáng tạt Sunrise 10kg/2.000m³. Sau khoảng 30p xử lý chất lơ lửng và phèn vàng.



TPD VAN PHAT DAT

THÀNH PHẦN

- Sorbitol
- Bổ sung tinh dầu thông đỏ mật độ cao, Cao Atiso, Cao Cà gai leo và nguyên liệu Immunevets vừa đủ.

CÔNG DỤNG

- Tăng cường phòng ngừa và hỗ trợ điều trị mờ đục trắng gan tôm.
- Cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho tôm.
- Cải thiện chức năng trao đổi chất, ổn định đường ruột, thúc đẩy khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

CÁCH DÙNG

- Liều phòng: tạt trực tiếp vào buổi sáng có nắng khi tôm 1-30 ngày tuổi.
- Liều sử dụng: Cho ăn 10ml/kg TẤ tạt kết hợp 1 lít/700-1.000m³.
- Trị bệnh: Cắt cử bỏ đói cho đến khi hồi phục, cho ăn 20ml/kg TẤ.

TPD GOLD

THÀNH PHẦN

- Acid axetic
- Bổ sung dung môi, hoạt chất diệt nấm, diệt khuẩn vừa đủ.

CÔNG DỤNG

- Diệt khuẩn kỵ khí gây bệnh TPD cho tôm.
- Phòng bệnh do vi khuẩn kỵ khí gây mờ đục trắng gan.
- Hỗ trợ giảm pH và kiềm tảo phát triển quá mức.
- Ổn định môi trường nuôi.

CÁCH DÙNG

- Xử lý trước khi thả tôm 1-2 ngày: 1.5-2 lít/1.000m³ nước.
- Trước khi thả giống 2 giờ: 1 lít/2.000m³, 0,6 lít/1.000m³ định kỳ 3 ngày/lần lúc 8 giờ tối, khi xử lý nên chạy quạt tối đa.
- Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng,...: 1,5 lít/1.000m³ lúc 7 giờ tối.

Lưu ý: Do nồng độ thuốc cao, nồng nên hòa tan vào nước trước khi tạt.



VUA ÉP KHUẨN

THÀNH PHẦN

- Bacillus spp
- Bổ sung thực khuẩn, vi sinh dạng bào tử và giá thể (nếu có)

CÔNG DỤNG

- Kích hoạt thực khuẩn nhằm ức chế vi khuẩn vibrio, vi bào tử trùng EHP, nấm có hại trong môi trường ao nuôi.
- Phân hủy nhanh khí độc NH₃, H₂S, NO₂ trong ao.
- Xử lý tạt chất (chất thải, thức ăn dư) dưới nền đáy ao.
- Cạnh tranh, ức chế tảo độc và vi khuẩn vibrio, ổn định màu nước.

CÁCH DÙNG

- Dùng 500g Vua ép khuẩn + 2kg đường vàng + 500g muối hột ủ yếm khí với 200 lít nước.
- Thời gian ủ từ 3h-24h trước khi sử dụng.
- Sử dụng: 5 lít/1.500-2.000 m³ nước. Sử dụng hằng ngày.

CUNG CẤP CÁ RÔ PHI GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

Chuyên cung cấp giống cá rô phi chất lượng cao, khỏe mạnh, đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn nuôi thương phẩm và xuất khẩu.



Vạn Phát Đạt chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung cấp **giống cá rô phi Bảo Lộc** chất lượng cao từ nguồn cá bố mẹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Với quy trình sản xuất hiện đại và kiểm soát chặt chẽ, công ty mang đến nguồn giống khỏe mạnh, đồng đều, tăng trưởng nhanh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

CHỌN LỌC VÀ NUÔI CÁ BỒ MẸ

- Lựa chọn cá bồ mẹ có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao.
- Nuôi dưỡng trong điều kiện tối ưu để cá phát triển khỏe mạnh và thành thực sinh sản.



CHỌI SINH SẢN VÀ ẮP TRỨNG

- Cá bồ mẹ được đưa vào bể hoặc ao sinh sản.
- Thu trứng hoặc cá bột từ cá cái (tùy quy trình).
- Tiến hành ấp trứng trong hệ thống chuyên dụng để đảm bảo tỷ lệ nở cao.

ƯƠNG CÁ GIỐNG VÀ XUẤT BÁN

- Cá bột được ương trong ao hoặc bể với chế độ dinh dưỡng và quản lý môi trường phù hợp.
- Chọn lọc những con khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ.
- Kiểm tra chất lượng trước khi cung cấp cho người nuôi.



TỔNG QUAN VÙNG NUÔI

Hiện nay, Tập đoàn Vạn Phát Đạt đang triển khai dự án phát triển vùng nuôi Cá rô Phi thương phẩm bằng lồng bè hoặc lồng HDPE trên các lòng hồ thủy điện, sông, suối có điều kiện tự nhiên phù hợp.

Những địa điểm đã thực hiện bao gồm: Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Nai, các tỉnh ven biển miền Trung như: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...



HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT & ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NUÔI

Vạn Phát Đạt thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi, con giống, thuốc và các chính sách hỗ trợ cho đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro về chi phí và thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện phát triển nghề nuôi Cá Rô Phi theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững.



Chính sách hỗ trợ

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỨC ĂN

Nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào, hỗ trợ người nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế trong giai đoạn Cá rô Phi tăng trưởng mạnh và chuẩn bị thu hoạch. Công ty triển khai chính sách hỗ trợ thức ăn với các điều kiện sau:

- **Đối tượng áp dụng:** Các hộ nuôi, đối tác tham gia chương trình liên kết nuôi cá rô phi bằng lồng HDPE với công ty.
- **Hình thức hỗ trợ:** Công nợ
- **Thời gian hỗ trợ:** từ 1 - 1,5 tháng cuối trước khi thu hoạch.
- **Mức giá dự kiến:** Biến động theo nhà sản xuất và sự thỏa thuận giữa Công ty và đối tác.
- **Điều kiện áp dụng:** Thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu về quản lý nuôi, sử dụng thuốc và thức ăn theo hướng dẫn của Công ty.



CHÍNH SÁCH BAO TIÊU ĐẦU RA

Nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho người nuôi, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, Công ty cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm Cá rô Phi thương phẩm đạt tiêu chuẩn theo các điều kiện sau:

- **Đối tượng thu mua:** Cá rô phi thương phẩm từ các hộ tham gia chương trình liên kết.
- **Giá thu mua:** Căn cứ vào chất lượng của sản phẩm từng vụ và biến động của thị trường.
- **Tiêu chuẩn chất lượng:** Cá khỏe mạnh, đồng đều, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thỏa thuận.



VẠN PHÁT ĐẠT GROUP

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: congyvanphatdat@gmail.com

Phone: +84-916-003-746

Website: www.vanphatdatgroup.com

Product Catalogue

2026



VẠN PHÁT ĐẠT - VẠN MÙA BỘI THU